



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БРОНХИКУМ® С BRONCHICUM® С

Торговое название препарата: Бронхикум® С

Лекарственная форма: пастилки

Состав

1 пастилка содержит:

Активный компонент:

экстракт травы тимьяна жидкий – 100 мг

Вспомогательные компоненты: сахароза, повидон, левоментол, цинеол, акации камедь, стеариновая кислота, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Описание активного компонента: экстракт травы тимьяна жидкий (Thymus vulgaris L., сем. Lamiaceae):

Соотношение экстракта к эстрагенту = 1:2-2,5

Эстрагент: раствор аммиака 10%, глицерин 85%, спирт этиловый 90% (об/об), вода; в соотношении 1 :20 :70 :109.

Описание: круглые, слегка двояковыпуклые пастилки кремового цвета с небольшими вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа: Отхаркивающее средство растительного происхождения

Код АТХ: R05CA10.

Фармакологические свойства

Обладает отхаркивающим и муколитическим действием.

Вследствие наличия компонентов эфирных масел, полученных из тимьяна, Бронхикум® С пастилки обладают бронхолитическим, отхаркивающим и антибактериальным действием. Разжижение и отхаркивание секрета слизистой оболочки бронхов увеличивается, бронхоспазм уменьшается, рост и размножение микроорганизмов подавляется.

Показания к применению

В качестве симптоматического средства при лечении воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Способ применения и дозы

Пастилки рассасывают в полости рта.

Взрослым и детям старше 12 лет следует рассасывать в полости рта по 1-2 пастилки несколько раз (до 3 раз) в день.

Детям от 6 до 12 лет – по 1 пастилке 3 раза в день.

Длительность применения препарата определяется степенью выраженности симптомов заболевания и его продолжительностью.

Побочное действие

В редких случаях могут возникать аллергические реакции, такие как кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек лица и слизистой оболочки полости рта и глотки (отек Квинке). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), тяжелые нарушения функции печени и почек, детский возраст (до 6 лет).

Препарат не рекомендуется применять в период беременности и грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Одна пастилка соответствует 0,07 ХЕ (хлебных единиц), что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете.

При отсутствии улучшения состояния в течение 5 дней необходимо проконсультироваться с врачом.

Необходимо соблюдать осторожность у пациентов с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы и галактозы или недостаточностью сахаразы, изомальтазы.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте и не применять по истечении срока годности.

Форма выпуска

Пастилки. По 10 пастилок в блистерах из ПВХ/алюминиевой фольги. По 2 блистера помещены вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре ниже 25°C.

Срок хранения

2 года.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Название и адрес производителя

Санофи-Авентис Сп. з о.о., Польша.

Ул. Любельска 52, 35-233 Жешув, Польша.