

«ОДОБРЕНО»
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Главное управление по контролю качества
лекарственных средств и медицинской техники
№ 23 от «21» 10 2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БРОНХИКУМ® С
BRONCHICUM® S

Торговое название препарата: Бронхикум® С.

Лекарственная форма: сироп.

Состав

В 100 мл сиропа содержится:

активный компонент: экстракт травы тимьяна жидкий – 15 г;

(соотношение травы тимьяна к экстрагенту 1:2-2,5).

Экстрагент: раствор аммиака 10% (масса/масса), глицерол 85%, этанол 90% (об/об), вода – в соотношении 1:20:70:109;

вспомогательные компоненты:

натрия бензоат, розы масло, ароматизатор медовый, ароматизатор вишневый (сок вишневый концентрированный), сахарный сироп инвертный (сахароза, декстроза, фруктоза), декстроза жидкая (глюкоза жидкая), сахарный сироп 67% (сахароза), лимонной кислоты моногидрат, вода очищенная.

Описание: прозрачный или с легкой опалесценцией раствор красновато-коричневого цвета со слабым запахом меда.*

* На дне флакона с препаратом может образоваться осадок.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: R05CA.

Фармакологические свойства

Препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, бронхолитическое, противомикробное действие, способствует снижению вязкости мокроты и ускорению ее эвакуации.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-фруктозная мальабсорбция, недостаточность ферментов сахаразы и изомальтазы, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), тяжелые нарушения функции печени и почек, детский возраст (до 6 месяцев).

В связи с содержанием в препарате этилового спирта сироп Бронхикум С не должен использоваться у больных алкоголизмом.

С осторожностью и только после консультации с врачом следует принимать сироп пациентам с заболеваниями печени, заболеваниями и травмами головного мозга, эпилепсией.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не рекомендуется при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Если врач не назначил другого режима дозирования, *взрослым и подросткам* назначают внутрь после еды по 2 чайные ложки сиропа (10 мл) 3 раза в сутки;

детям от 6 до 12 лет – по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки;

детям от 2 до 6 лет – по 1 чайной ложке (5 мл) 2 раза в сутки;

детям от 1 года до 2 лет – по 1/2 чайной ложке (2,5 мл) 3 раза в сутки;

детям от 6 месяцев до 12 месяцев – по 1/2 чайной ложке (2,5 мл) 2 раза в сутки.

Сироп от кашля следует принимать через равные промежутки времени в течение суток.

Длительность применения препарата определяется терапевтической необходимостью и продолжительностью заболевания.

В связи с тем, что на дне флакона с препаратом возможно образование осадка, необходимо встряхивать флакон перед применением.

Побочное действие

В редких случаях возможны следующие реакции:

аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, а также отек лица и слизистой полости рта и глотки (отек Квинке);

со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, гастрит, диспепсия.

В этих случаях, а также в случае развития каких-либо нежелательных явлений, не указанных в инструкции, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Не сообщалось о случаях развития интоксикации при приеме сиропа от кашля Бронхикум С.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Сироп от кашля Бронхикум С содержит 4,9 объемных % спирта этилового.

Содержание абсолютного этилового спирта в граммах в максимальных разовых и суточных дозах препарата.

Максимальная разовая и максимальная суточная дозы	Количество абсолютного этилового спирта, в граммах
<i>Взрослые и подростки</i>	
Разовая доза 10 мл	< 0,3867
Суточная доза 30 мл	< 1,1601
<i>Дети от 6 до 12 лет</i>	
Разовая доза 5 мл	< 0,1934
Суточная доза 15 мл	< 0,5801
<i>Дети от 2 до 6 лет</i>	
Разовая доза 5 мл	< 0,1934
Суточная доза 10 мл	< 0,3867
<i>Дети от 1 до 2 лет</i>	
Разовая доза 2,5 мл	< 0,0967

Суточная доза 7,5 мл	< 0,2900
<i>Дети от 6 до 12 месяцев</i>	
Разовая доза 2,5 мл	< 0,0967
Суточная доза 5 мл	< 0,1934

В случае, если улучшения состояния больного не наступает, или в случае появления приступов удушья, гнойной мокроты, а также при повышении температуры следует немедленно обратиться к врачу.

Информация для больных сахарным диабетом

5 мл сиропа (примерно 1 чайная ложка) соответствуют 0,3 ХЕ (хлебных единиц).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

В период приема препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

По 100 мл в стеклянный флакон с навинчивающейся пластмассовой крышечкой с контролем первого вскрытия, на которую надет пластмассовый стаканчик-дозатор. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению упакован в картонную пачку.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

После вскрытия флакона сироп от кашля можно принимать в течение 3 месяцев.

Условия хранения

При температуре ниже +25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Произведено

A.Nattermann & Cie GmbH

Nattermannallee 1, D-50829 Köln, Germany

А. Наттерманн энд Сие. ГмбХ, Германия.

Наттерманналее 1, Д-50829, Кёльн, Германия.