



**Инструкция
(для пациентов)
по медицинскому применению препарата
ЭНТЕРОЖЕРМИНА®
ENTEROGERMINA®**

Внимательно прочитайте этот листок-вкладыш, прежде чем начать приём препарата. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Этот препарат предназначен для Вас. Не следует передавать его другим людям. Это может нанести вред их здоровью, даже если симптомы их заболевания схожи с теми, которые наблюдаются у Вас.

Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться прочитать его ещё раз.

Торговое название препарата: Энтерожермина®/Enterogermina®.

Международное непатентованное название: отсутствует.

Лекарственная форма: капсулы

Состав:

В одной капсуле содержится:

активное вещество: споры *Bacillus clausii*, полирезистентные к антибиотикам, - 2 миллиарда;

вспомогательные вещества: каолин, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат;

состав капсулы: желатин, титана диоксид (E171), вода очищенная.

Описание: твердые белые желатиновые капсулы, содержащие мелкий порошок от беловатого цвета до цвета слоновой кости.

Фармакотерапевтическая группа: противодиарейное средство.

Код АТХ: A07FA.

Показания к применению

Лечение и профилактика кишечного дисбактериоза (дисмикробиоза) и последующего эндогенного дисвитаминоза.

Лечение по восстановлению кишечной микробной флоры, изменённой в ходе лечения антибиотиками или химиотерапевтическими средствами.

Острые и хронические желудочно-кишечные расстройства у детей, характерные для интоксикации или кишечного дисбактериоза (дисмикробиоза) и дисвитаминоза.

Дозировка и способ применения

Для приема внутрь.

Дозировка

Взрослым: 2-3 капсулы в день. Лечащий врач может рекомендовать иную суточную дозировку, в зависимости от состояния пациента.

Рекомендуемые интервалы между приемами однократной дозы препарата (1 капсула) составляют 3-4 часа.

Дети старше 6 лет: 1-2 капсулы в день. Лечащий врач может рекомендовать иную суточную дозировку, в зависимости от состояния пациента.

Если суточная доза препарата составляет одну капсулу в день, препарат должен быть принят один раз в день.

Если суточная доза превосходит 1 капсулу, рекомендуемые интервалы между приемами однократной дозы препарата (1 капсула) составляют 3-4 часа.

Способ применения

Капсулу следует запить небольшим количеством воды или другого напитка. В случае, когда детям сложно проглотить капсулу, следует использовать препарат в виде суспензии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или какому-либо из ингредиентов препарата.

Особые указания и предосторожности применения

Особые указания

Данный препарат не противопоказан для применения при целиакии (или глютеновой болезни).

Меры предосторожности

Во время антибиотической терапии препарат следует принимать в перерывах между приемами антибиотиков.

Беременность и грудное вскармливание

Прием данного лекарственного препарата не противопоказан во время беременности и грудного вскармливания.

Побочное действие

Имеются сообщения об аллергических реакциях, таких, как сыпь и крапивница, полученных в ходе применения препарата.

Передозировка

На настоящий момент клинических проявлений передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия

Лекарственные взаимодействия в результате одновременного приема с другими лекарственными средствами не известны.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами

Препарат не влияет на способности, необходимые для управления транспортными средствами и машинным оборудованием.

Форма выпуска

По 12 капсул в ПВХ/ПВДХ/Ал блистере. По 1 или 2 блистера в картонной коробке вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Санofi-Авентис С.п.А., Италия (Sanofi- Aventis S.p.A., Italy)
Виале Европа,11, 21040 Ориджио, Италия