



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
МААЛОКС®
MAALOX

Торговое название препарата: Маалокс®

Действующие вещества (МНН): алюминия гидроксид + магния гидроксид

Лекарственная форма: суспензия для приёма внутрь

Состав:

Один пакетик суспензии (15 мл) содержит:

активные вещества:

магния гидроксид 600 мг;

алюминия гидроксид 525 мг;

вспомогательные вещества:

концентрированная хлористоводородная кислота 0,018 мл;

моногидрат лимонной кислоты (E330) 9,82 мг;

эфирное масло мяты перечной 1,89 мг;

маннитол (E421) 37,50 мг;

метилпарагидроксибензоат (E218) 15,00 мг;

пропилпарагидроксибензоат (E216) 7,50 мг;

сахаринат натрия (E954) 4,215 мг;

сорбитол 70% (некристаллизующийся) (E420) 214,3 мг;

пероксид водорода 30% 9,75 мг;

очищенная вода до 15 мл.

Описание: кремообразная жидкость, по внешнему виду напоминающая молоко, имеет сладкий вкус и запах мяты.

Фармакотерапевтическая группа: антацидное средство.

Код АТХ: A02AX.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Маалокс представляет собой хорошо сбалансированную комбинацию гидроксида магния и гидроксида алюминия, что обеспечивает его высокую способность нейтрализовывать кислое желудочное содержимое и защищать слизистую пищевода и желудка. Применяется как адсорбирующее, обволакивающее и антацидное средство при повышенной кислотности желудочного сока. Маалокс купирует боль в верхних отделах пищеварительного тракта на несколько часов. Маалокс не вызывает запоров.

Фармакокинетика

Гидроксиды магния и алюминия считаются антацидами местного действия, практически не всасывающимися из желудочно-кишечного тракта при приеме в рекомендуемых дозах и, соответственно, не оказывающими общих эффектов на организм.

Показания к применению

Антацидная терапия при изжоге и гастроэзофагальном рефлюксе, сопровождающимся забросом кислого желудочного содержимого в пищевод. Симптомами являются отрыжка, срыгивание, болезненное и затрудненное глотание, боли в эпигастральной области (чуть ниже проекции солнечного сплетения), появляющиеся вскоре после еды и усиливающиеся при наклонных движениях. Терапия может применяться у пациентов старше 15 лет.

Способ применения и дозы

Для применения пациентами старше 15 лет.

Маалокс принимают обычно через 1-1,5 ч. после еды или при возникновении болей. Маалокс в виде суспензии принимают по 15 мл (1 пакетик). Перед употреблением суспензию гомогенизировать, тщательно разминая пакетик между пальцами. Содержимое пакетика выдавить в ложку или в рот, не разбавляя водой. При необходимости можно принять дополнительную дозу препарата через два часа после предыдущего приема, но не более 6 приемов в день.

Побочные действия

При соблюдении предписанных доз побочное действие препарата незначительно.

В редких случаях при применении препарата могут возникать запоры, тошнота, рвота, изменение вкусовых ощущений. В случае длительного применения и при нарушении выделительной функции почек возможны повышение уровня магния и/или алюминия в плазме крови, развитие дефицита фосфора в организме, энцефалопатии. У пожилых больных возможно обострение костно-суставных заболеваний, болезни Альцгеймера.

Противопоказания

- Тяжелая почечная недостаточность, так как препарат содержит магний.
- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- Возраст до 15 лет.
- Непереносимость фруктозы.

Лекарственные взаимодействия

Антациды взаимодействуют с некоторыми другими лекарственными препаратами для приема внутрь.

Комбинации, требующие соблюдения мер предосторожности

- *С хинидином*

При одновременном применении с хинидином возможно повышение сывороточных концентраций хинидина и развитие передозировки хинидина.

В случае одновременного приема внутрь Маалокс может снижать абсорбцию различных лекарственных средств. Поэтому, в качестве меры предосторожности, следующие препараты рекомендуется принимать за 2 часа до либо через 2 часа после приема Маалокса:

- *H₂-антигистаминные средства, этамбутол, изониазид (перорально), атенолол, метопролол, пропранолол, цефдинир, цефподоксин, хлорохин, циклины, дифлунизал, дигоксин, дифосфонаты, фексофенадин, соли железа, фторхинолоны, фтористый натрий, глюкокортикостероиды (преднизолон и дексаметазон), индометацин, кейксалат, кетоконазол, ланзопразол, линкозамиды, фенотиазиновые нейролептики, пеницилламин, фосфор (добавки), тироксин.*

Комбинации, которые следует принимать во внимание

- *С салицилатами*

При одновременном приеме салицилатов и длительном использовании препарата Маалокс в высоких дозах может увеличиться выведение салицилатов с мочой в результате ощелачивания мочи под влиянием препарата Маалокс.

- *С цитратами*

При сочетании гидроксида алюминия с цитратами возможно увеличение плазменных концентраций алюминия, в особенности, у пациентов с почечной недостаточностью.

Особые указания

Особые указания

Следует соблюдать 2-х часовой интервал между применением Маалокса и других препаратов.

Пациенту следует обратиться к лечащему врачу в случае:

- снижения массы тела; - затруднений при глотании и не устранившегося, несмотря на лечение, чувства дискомфорта в животе;
- нарушения пищеварения, появившегося впервые, изменений в имеющихся нарушениях пищеварения; - почечной недостаточности.

Данный лекарственный препарат противопоказан при непереносимости фруктозы, синдроме мальабсорбции глюкозы или галактозы, или дефиците сахаразы-изомальтазы, и должен применяться с осторожностью у больных сахарным диабетом из-за наличия в нём сорбитола и сахаразы.

Меры предосторожности

При низком содержании фосфора в диете гидроксид алюминия может вызывать дефицит фосфора в организме.

В случае пациентов с почечной недостаточностью или находящихся на хроническом диализе необходимо учитывать содержание алюминия и магния в препарате.

Гидроксид алюминия может быть небезопасен для пациентов с порфирией, находящихся на гемодиализе.

Длительное применение препарата не рекомендуется.

Если во время терапии симптомы наблюдаются более 10 дней, а также в случае ухудшения течения заболевания, следует установить причину этих симптомов и пересмотреть лечение.

Беременность и грудное вскармливание

С особой осторожностью следует назначать беременным и кормящим женщинам.

Следует учитывать содержание ионов алюминия и магния, способных оказывать влияние на проходимость желудочно-кишечного тракта:

- соли магния гидроксида могут вызывать диарею;
- соли алюминия могут быть причиной запора и ухудшать течение запоров, часто наблюдаемых во время беременности.

Следует избегать назначения препарата во время беременности в больших дозах и в течение длительного времени. Во время лечения можно продолжать грудное вскармливание. Магний считается совместимым с лактацией.

Передозировка

Передозировка магния обычно не вызывает токсических реакций у пациентов с нормальной функцией почек. Тем не менее, отравление магнием может развиваться у пациентов с почечной недостаточностью (см. раздел *Меры предосторожности*).

Токсический эффект зависит от концентрации магния в сыворотке крови.

Признаки токсического действия: снижение артериального давления, тошнота, рвота, сонливость, снижение рефлексов, мышечная утомляемость, нервно-мышечный паралич, брадикардия, отклонение результатов ЭКГ, гиповентиляция. В наиболее тяжелых случаях может развиваться паралич дыхания, кома, нарушение функции почек или сердца, анурический синдром.

Лечение передозировки магния: регидратация, форсированный диурез. В случае почечной недостаточности необходим гемодиализ или перитонеальный диализ.

Форма выпуска

Суспензия в пакетиках 15 мл.

По 30 пакетиков в упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

ФАРМАТИС, Франция

для САНОФИ-АВЕНТИС ФРАНС, Франция.

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственного средства на территории Республики Узбекистан:

Представительство «Санофи-Авентис Групп» в Республике Узбекистан

Узбекистан, г. Ташкент, 100015, ул. Ойбека, 24.

Тел.: (998 71) 281 46 28/29; Факс: (998 71) 281 44 81

www.sanofi.uz