



ТИББИЁДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМАСИ

MAGNE B6®

MAGNE B6®

Сизга дори воситасини қабул қилишни бошлашдан олдин ушбу йўриқномани диққат билан ўқиб чиқишингизни сўраймиз. У Сиз учун муҳим маълумот сақлайди
Ушбу қўллаш бўйича маълумотли илова-варақани сақланг, чунки кейинроқ уни яна ўқиб чиқиш талаб қилиниши мумкин.

Ҳар қандай қўшимча маълумот ёки маслаҳат олиш учун, илтимос Ўзингизнинг шифокорингизга мурожаат қилинг.

Сизнинг шифокорингиз ушбу дори препаратини шахсан Сизга ёзиб берган, Сиз уни бошқа шахсларга бермаслигингиз керак.

Препаратнинг савдо номи: Магне В6®

Халқаро патентланмаган номи: магний лактати дигидрати, пиридоксин гидроксида.

Дори шакли: қобиқ билан қопланган таблеткалар

Таркиби:

1 қобиқ билан қопланган таблетка қуйидагиларни сақлайди:

фаол моддалар: магний лактат дигидрати - 470 мг, пиридоксин гидрохлориди - 5 мг

ёрдамчи моддалар: сахароза, оғир каолин, акация елими, карбоксиполиметилен 934, тальк (магний гидросиликати), магний стеарати, карнауб муми (кукун), титан диоксида.

Таблеткадаги магний (Mg^{2+}) нинг умумий миқдори 48 мг (1,97 ммоль) ни ташкил қилади.

Таърифи: овал, силлиқ, ялтироқ, оқ рангли қобиқ билан қопланган таблеткалар.

Фармакотерапевтик гуруҳи: витамин-минералли мажмуа.

АТХ коди: А12

Фармакодинамикаси

Физиологик аспекти:

Магний асосан хужайра ички катиони ҳисобланади. У нейронларнинг қўзғалувчанлигини ва қўзғалашни нерв-мушак бўйлаб ўтказилишини пасайтиради, Кўпчилик ферментатив жараёнларда иштирок этади. Магний аъзолар ва тўқималарнинг муҳим элементи ҳисобланади: суяк тўқимасида одам организмидаги магнийнинг умумий миқдорини ярми сақланади.

Клиник аспекти:

Зардобдаги магнийнинг даражалари:

- 12 ва 17 мг/л гача (1-1,4 мЭкв/л ёки 0,5-0,7 ммоль/л) орасида: магнийнинг ўртача танқислигини кўрсатади

- 12 мг/л дан паст (1 мЭкв/л ёки 0,5 ммоль/л) –магнийнинг оғир танқислигини кўрсатади.

Танқислик

- бирламчи, магний метаболизмини туғма аномалияси туфайли бўлиши мумкин:

- қуйидагилар иккиламчи туфайли бўлиши мумкин:

- организмга ноадекват тушиши (оғир етарли овқатланмаслик, алкоголизм, тўлик парентерал овқатланиш),

- меъда-ичакда сўрилишини бузилишлари (сурункали ич кетиши, меъда-ичак окмаси, гипопаратирозидизм),

- буйрақлар миқёсида ортиқча йўқотилиши (буйрақ найчаларнинг касалликлари, жиддий полиурия, диуретикларни суистеъмол қилиш, сурункали пиелонефрит, бирламчи гиперальдостеронизм, цисплатин билан даволаниш) туфайли юз бериши мумкин.

Пиридоксин (В₆ витамини) кўпчилик метаболик жараёнларда, нерв тизимининг метаболизмини бошқарилишида иштирок этади. В₆ витамини магнийни меъда-ичак йўлларида сўрилишини ва уни хужайраларга киришини яхшилайдди.

Қўлланилиши

Ушбу дори воситаси магний сақлайди.

Қуйидаги симптомларнинг маълум сонини мажмуаси магнийнинг танқислигидан далолат бериши мумкин:

- Асабийлик, таъсирчанлик, кучсиз хавотирлик, ўткинчи толиқиш, уйқуни бироз бузилиши,
- Меъда-ичак спазмлари, юракни тез-тез уриши (соғлом юракда) шаклидаги безовталиқ кўринишлари,
- Мушак тиришишлари, санчилиш ҳисси.

Магнийни буюриш бу симптомларни йўқотишга ёрдам бериши мумкин.

Агар бир ой даволашдан кейин яхшиланиш кузатилмаса, ушбу препарат билан монотерапияни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмас.

Қўллаш усули ва дозалари

Таблеткаларни катта стакан сув билан бирга қабул қилиш керак.

Фақат катталар ва 6 ёшдан ошган болалар учун

Катталар: 2-3 қабулга бўлинган суткада 6-8 таблеткадан, овқат қабул қилиш вақтида.

Болалар: суткада 10-30 мг/кг, яъни 6 ёшдан ошган болаларга (тана вазни тахминан 20 кг) 2-3 қабулга бўлинган суткада 4-6 таблетка, овқатланиш вақтида.

Одатда даволашнинг давомийлиги бир ойни ташкил қилади.

Қондаги магнийнинг даражаси нормаллашганидан кейин даволашни тўхтатиш керак.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Ушбу препаратни қуйидаги ҳолларда қўллаш мумкин эмас:

- Препаратнинг компонентларидан бирига юқори сезувчанлик,
- Креатинин клиренси минутига 30 мл дан кам бўлган оғир буйрак етишмовчилигида қўллаш мумкин эмас.

Махсус кўрсатмалар

Кальций танқислиги билан боғлиқ бўлган, кўшимча кальций юбориш бошлангунича, магнийнинг танқислиги бартараф қилинган бўлиши керак.

Таблеткаларда сахароза борлиги туфайли, фруктозани ўзлаштираолмасликда, глюкоза ёки галактозанинг сўрилишини бузилиши синдромида ёки сахароза-изомальтаза танқислигида препаратни қўллаш мумкин эмас.

Магнийнинг оғир танқислигида ва сўрилишини бузилишларида, даволаш вена ичига юборишдан бошланиши керак.

Қўллашдаги эҳтиёткорлик чоралари

таблеткалар катталар ва 6 ёшдан ошган болалар учун мўлжалланган.

6 ёшдан кичик болалар учун мос келувчи дори шакллари мавжуд.

Ўртача буйрак етишмовчилигида, гипермагниемия билан боғлиқ бўлган хавфни олдини олиш мақсадида эҳтиёткорликка риоя қилиш керак.

Ҳомиладорлик ва эмизиш

Ҳомиладорликнинг етарли сондаги клиник тажриба, ҳеч қандай фетотоксик ёки ривожланиш нуқсонларини чақирувчи таъсирини аниқламаган.

Зарурати бўлганда магний ҳомиладорликнинг ҳар қандай босқичида қўлланиши мумкин.

Кенг қамровли текширишлар йўқлигига қарамасдан, бор бўлган клиник тажриба умидли ҳисобланади.

Лактация даври

Магнийни она сутига ўтиши туфайли, препаратни эмизиш даврида қўллашдан сақланиш керак.

Ножўя таъсирлари

Қуйида таърифланган симптомлар пайдо бўлган ҳолда, илтимос, дарҳол Ўзингизнинг даволовчи шифокорингизга мурожаат қилинг!

- диарея
- абдоминал оғриқлар
- тери реакциялари
- аллергия реакциялар.

Дозани ошириб юборилиши

Агарда буйраклар нормал ишлаётган бўлса, магнийнинг перорал дозасини ошириб юборилиши одатда токсик реакцияларга олиб келмайди. Аммо магний билан заҳарланиш буйрак етишмовчилигида ривожланиши мумкин.

Даволаш: регидратация, жадаллаштирилган диурез. Буйрак етишмовчилигида гемодиализ ёки перитонеал диализ зарур.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Тавсия қилинмайдиган мажмуалар

- *Фосфор ёки кальций тузлари*

Бу препаратлар магнийни ичакдан сўрилишини сусайтирадилар.

Эътиборга олиш керак бўлган мажмуалар

- *Перорал тетрациклинлар*

Тетрациклинлар ва магнийни ичга қабул қилиш орасида, тетрациклинларни меъда-ичак йўлларида сўрилишини пасайиши туфайли, камида 2 соатлик интервалга риоя қилиш керак.

Транспорт воситалари ёки бошқа механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири

Алоҳида тавсиялар йўқ.

Чиқарилиш шакли

Қобик билан қопланган таблеткалар, блистерларда.

10 таблеткадан блистерда, 5 блистер тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга картон қутида.

Сақлаш шароити

Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда.

Болалар олаолмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик муддати

24 ой.

Ўрамида кўрсатилган яроқлилик муддати ўтгач қабул қилинмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи:

Санофи Винтроп Индустрия, Франция.

Ишлаб чиқариш манзили:

1, rue de la Vierge AMBARES ET LAGRAVE

33565 CARBON BLANC CEDEX
France (Франция)

Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги дори воситасининг сифатига тегишли шикоятлар (таклифлар)ни қабул қилувчи ташкилотнинг манзили ва номи:
«Санofi-Авентис Групп» компаниясининг Ўзбекистон Республикасидаги ваколатхонасининг
Ойбек кўчаси, 24, Тошкент ш., 100015, Ўзбекистон
Тел.: (998 71) 281 46 28/29
Факс.: (998 71) 281 44 81
www.sanofi.uz