



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МИФУНГАР® MYFUNGAR

Торговое название препарата: Мифунгар®

Действующее вещество (МНН): оксиконазол

Лекарственная форма: крем для наружного применения

Состав:

Одна туба (30 г крема) содержит:

активное вещество: оксиконазол - 0,300 г (в виде оксиконазола нитрата - 0,3441 г);

вспомогательные вещества: стеариловый спирт, цетиловый спирт, парафин мягкий белый, полисорбат 60, пропиленгликоль, бензойная кислота, вода очищенная

Описание: белый или почти белый гомогенный, гидрофильный, однородной консистенции непрозрачный крем, представляющий собой эмульсию типа «масло в воде» почти без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: противогрибковое средство

Код АТХ: D01AC11.

Фармакологические свойства

Действующим веществом является оксиконазол - синтетический дериват имидазола, оказывает противогрибковое, а также противомикробное действие. Угнетает биосинтез эргостерола, входящего в состав клеточной мембраны патогенных грибов. Активен в отношении дерматофитов, дрожжевых и других грибов рода *Trichophyton* spp., *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum* spp., *Candida albicans*, *Pityrosporum* spp., *Aspergillus* spp. Активен также в отношении ряда микроорганизмов рода *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Corynebacterium* spp.

Фармакокинетика

При наружном нанесении отмечается незначительное всасывание оксиконазола кожей, большая часть нанесенного активного вещества накапливается в роговом слое кожи. Через 5 часов после нанесения на кожу крема в дозе 2,5 мг/см² концентрация оксиконазола в эпидермисе составляет 16,2 мкмоль (в поверхностном роговом слое – 3,64 мкмоль, в более глубоких слоях – 1,29 мкмоль). Всасывается менее 1% нанесенного количества, после наружного нанесения крема в дозе 150 мг, оксиконазол в сыворотке крови не определяется.

Показания к применению

Грибковые заболевания кожи и волосяного покрова, вызванных чувствительными к препарату возбудителями.

Способ применения и дозы

Для наружного применения. Наносить на пораженное место тонким слоем 1 раз в сутки, лучше на ночь. Продолжительность курса лечения: при микозах кожи – 2 недели, при микозах стоп – 1 месяц. Для предотвращения рецидива заболевания рекомендуется продолжить лечение препаратом в течение 1 - 2 недель после признаков полного выздоровления. Продолжительность курса лечения препаратом более 6 месяцев не рекомендуется.

Побочные действия

Возможны побочные реакции в виде аллергического дерматита, боли, покраснения, зуда кожи, кожной сыпи, трещины, мацерации кожи, фолликулита, чувства жжения, покалывания.

При появлении признаков повышенной чувствительности или раздражения кожных покровов применение препарата следует прекратить и сообщить об этом врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к производным имидазола, другим компонентам препарата; детский возраст (до 8 лет).

Лекарственные взаимодействия

Данных о взаимодействии препарата Мифунгар® с другими лекарственными средствами не получено.

Особые указания

Без консультации врача не применять с другими препаратами для местного применения.

При лечении грибковых заболеваний наружных половых органов, вызванных чувствительными к препарату возбудителями, необходимо одновременное лечение половых партнеров. Следует избегать попадания препарата в глаза.

Применение препарата во время беременности и кормления грудью: не рекомендуется применение препарата Мифунгар® во время беременности (адекватных и строго контролируемых исследований у беременных не проводилось) и кормления грудью (оксиконазол проникает в грудное молоко).

Препарат не следует применять после истечения срока годности и следует хранить в недоступном для детей месте.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны. При случайном приеме препарата внутрь возможно появление тошноты и рвоты. Необходимо промыть желудок и обратиться к врачу, при необходимости проводят симптоматическое лечение.

Форма выпуска

По 30 г крема для наружного применения 1% в алюминиевой тубе. Каждая туба помещена в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C.

Срок годности

3 года.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Название и адрес изготовителя

Зентива к.с., У кабеловны 130, 102 37 Прага 10, Долни Мехолупы, Чешская Республика.