



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МИКОСЕПТИН®
MYKOSEPTIN®

Торговое название препарата: Микосептин®

Действующее вещество (МНН): ундециленовая кислота +ундециленат цинка

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав:

Каждая туба (30 г) содержит:

активные вещества: ундециленовая кислота - 1,500 г; ундециленат цинка - 6,000 г;

вспомогательные вещества: стеариновая кислота - 0,390 г; воск пчелиный белый -

0,690 г; парафин твердый (точка плавления 64-68 °С) - 1,500 г; парафин твёрдый - 1,050 г;

парафин жидкий - 10,110 г; метилпарагидроксibenзоат – 0,060 г; макрогола олеат -

1,200 г; моноглицериды дистиллированные - 0,990 г; парафин мягкий белый - 4,110 г;

вода очищенная - 2,400 г.

Описание: от почти белого до белого со светло-желтоватым оттенком цвета мазь, с характерным запахом и с мелкими жировыми зёрнами.

Фармакотерапевтическая группа: противогрибковое средство.

Код АТХ: D01AE54

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Ундециленовая кислота и её соли оказывают выраженное фунгистатическое действие в отношении дерматофитов рода *Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Microsporum*. Цинк, входящий в состав препарата, оказывает вяжущее действие, снижая, таким образом, проявления признаков раздражения кожных покровов, способствуя более быстрому заживлению.

Показания к применению

Лечение и профилактики грибковых заболеваний кожных покровов, вызванных чувствительными к препарату грибами (дерматофитами).

Способ применения и дозы

Для наружного применения.

Наносить на чистую, сухую поверхность поражённой кожи 2 раза в сутки.

Продолжительность курса лечения 4 - 6 недель. После исчезновения клинических проявлений заболевания, для предотвращения рецидива рекомендуется наносить мазь

1 раз в сутки в течение недели и далее, через день или 2 раза в неделю в течение одного месяца, сокращение курса лечения повышает риск рецидива заболевания.

Побочные действия

Возможны реакции повышенной чувствительности к компонентам препарата в виде покраснения, зуда кожных покровов, отёка, чувства жжения, кожной сыпи.

При появлении признаков повышенной чувствительности применение препарата следует прекратить и сообщить об этом врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ундециленовой кислоте и её производным, парабенам, к другим компонентам препарата; детский возраст (до 2 лет).

Лекарственные взаимодействия

Данных о взаимодействии препарата Микосептин® с другими лекарственными средствами не получено. Возможность одновременного использования других лекарственных средств для наружного применения определяется врачом.

Особые указания

Препарат Микосептин® нельзя наносить на открытую раневую поверхность, повреждённую поверхность кожных покровов, периорбитальную зону, следует избегать попадания мази в глаза.

Беременность и период кормления грудью

Прежде чем использовать препарат во время беременности и в период кормления грудью, следует обязательно проконсультироваться с врачом, так как во время беременности и в период кормления грудью применение препарата возможно только при наличии строгих показаний, которые должен установить врач если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Препарат не следует применять после истечения срока годности и следует хранить в недоступном для детей месте.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны. При случайном приеме препарата внутрь возможно появление тошноты и рвоты. Необходимо промыть желудок и обратиться к врачу, при необходимости проводят симптоматическое лечение.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения.

По 30 г мази в алюминиевых тубах. Каждая туба помещена в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Срок годности

3 года.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Название и адрес производителя

ЗЕНТИВА к.с., Чешская Республика,
10237, Прага 10, У Кабеловны 130, Долни Мехолупы.