



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПИНОСОЛ® PINOSOL®

Торговое название препарата: Пиносол®

Действующее вещество (МНН): нет

Лекарственная форма: капли назальные

Состав:

<i>Активное вещество:</i>	<i>на 10 мл (на флакон)</i>	<i>на 10 г (на флакон)</i>
масло сосны обыкновенной	0,3442 г	0,3752 г
масло эвкалиптовое	0,0459 г	0,0500 г
тимол	0,0029 г	0,0032 г
α-токоферола ацетат	0,1560 г	0,1700 г
масло мяты перечной	0,0917 г	0,1000 г
гвайазулен	0,0018 г	0,0020 г

Вспомогательные вещества: бутилгидроксианизол, макрогола и глицеридов абрикосового масла эфиры (лабрафил М-1944-CS), масло растительное.

Описание: прозрачная жидкость от синего до зелено-синего цвета с ментолово-эвкалиптовым запахом.

Фармакотерапевтическая группа: Средство для устранения симптомов ОРЗ.

Код АТХ: R01A

Фармакологические свойства

Обладает противовоспалительным и антисептическим действием.

Показания к применению

- Острый ринит;
- Хронический атрофический ринит;
- Острые и хронические воспалительные заболевания слизистых оболочек носа и носоглотки, сопровождающиеся сухостью слизистых оболочек носа;
- Состояния после оперативного вмешательства в полости носа - по назначению врача (в условиях стационара и амбулаторно).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, аллергический ринит, детский возраст до 1 года.

Лекарственные взаимодействия

Данных о взаимодействии препарата ПИНОСОЛ с другими лекарственными средствами не получено.

Особые указания

Избегать контакта препарата со слизистой глаз. Соблюдать особую осторожность при использовании препарата у детей.

Способ применения и дозы

Местно. Взрослым препарат закапывают в первый день по 1 - 2 капли в каждый носовой ход с интервалами в 1 - 2 часа. В последующие дни по 1 - 2 капли в каждый носовой ход

3-4 раза в сутки.

Детям закапывают по 1 – 2 капли 3 - 4 раза в день или используют ватный тампон.

Дети в возрасте от 1 года:

По 1-2 капли 3-4 раза в день только путем использования ватного тампона (палочки, обернутой ватой) для нанесения на слизистую носа.

Возможно применение препарата для ингаляций, для этого 2 мл (50 капель) закапывают в ингалятор. Ингаляции рекомендуется проводить 2-3 раза в день.

Длительность лечения 5-7 дней.

Побочные действия

Зуд, жжение, гиперемия или отек слизистой оболочки носовой полости.

При появлении нежелательных явлений или других необычных реакций, не описанных в инструкции, необходимо обратиться к врачу.

Беременность и лактация

Возможно применение препарата во время беременности и период грудного вскармливания (лактации).

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

Форма выпуска

Капли назальные.

По 10 мл во флаконах коричневого стекла, снабженных резиновой пипеткой с крышечкой. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещен в картонную пачку.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ЗЕНТИВА а.с., Словацкая Республика

Эйнштейнова 24, 851 01 Братислава, Словацкая Республика

(Zentiva a.s., Slovak Republic

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.)

Производитель

Санека Фармасьютикалс а.с., Словацкая Республика

Нитрианска 100, 920 27 Глоговец, Словацкая Республика

(Saneca Pharmaceuticals a.s., Slovak Republic

Nitrianska 100, Hlohovec 920 27)