



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОКТОСЕДИЛ PROCTOSEDYL

**Торговое название препарата:** Проктоседил® (Proctosedyl).

**Лекарственная форма:** мазь для местного применения

**Состав:**

В 1 грамме мази содержится:

*Активные вещества:*

гидрокортизона ацетат	5,58 мг
фрамицетина сульфат	10,00 мг
гепарин натрия	100 МЕ
эскулозид	10,00 мг
бензокаин (этиламинобензоат)	10,00 мг
бутамбен (бутиламинобензоат)	10,00 мг

*Вспомогательные вещества:* холестерин, парафин жидкий (Е905с), парафин мягкий белый (Е905с), полисорбат 80 (Е433), пропиленгликоль (Е1520), макрогол (полиэтиленгликоль) 400 (Е1521), макрогол (полиэтиленгликоль) 4000 (Е1521), макрогола (полиэтиленгликоль) 1500 (Е1521).

**Описание:** почти белая (с зеленовато-желтоватым оттенком) однородная гомогенная нежирная масса.

**Фармакотерапевтическая группа:** средство, применяемое в колопроктологии (противогеморроидальное средство)

**Код АТХ:** С05АХ03

### Фармакологические свойства

Комбинированный препарат для лечения геморроя и других заболеваний аноректальной зоны.

Гидрокортизон - глюкокортикостероид, является противовоспалительным средством. Устраняет различные признаки и симптомы воспаления, такие как: краснота, отечность, боль и др.

Натриевая соль гепарина является антикоагулянтом. Предотвращает тромботические осложнения геморроя.

Фрамицетина сульфат - антибиотик широкого спектра действия для местного применения. Обладает бактерицидной активностью в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Эскулозид родственен витамину Р, уменьшает повышенную ломкость капилляров.

Этиламинобензоат и бутиламинобензоат обладают местным обезболивающим и противозудным действием, уменьшают спазм анального сфинктера.

Эффект препарата проявляется через несколько минут после применения.

### Показания к применению

Внутренний и наружный геморрой; профилактика рецидивов; перианальная экзема, проктит, трещины заднего прохода; предоперационное и послеоперационное лечение больных с геморроем, послеродовой геморрой.

### Способ применения и дозы

Небольшое количество мази наносится пальцем на участки локализации зуда или боли утром и вечером, а также после каждой дефекации.

Для более глубокого введения в прямую кишку надеть аппликатор на тюбик с мазью, убедиться в том, что он введен достаточно глубоко в прямую кишку, и затем, осторожно нажимая на тюбик с нижнего конца, постепенно вынуть аппликатор.

Мазь можно применять отдельно или в сочетании с ректальными капсулами. Проктоседил® применяется в течение короткого времени (не более 7 дней).

#### **Побочные действия**

Возможно появление чувства дискомфорта в области прямой кишки, других реакций повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Возможно появление жжения, сухости слизистой оболочки, присоединение вторичной инфекции.

При применении Проктоседила® в высоких дозах и/или в течение длительного времени повышается риск возникновения системных побочных эффектов, связанных с гидрокортизоном.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Препарат нельзя применять при туберкулезном, вирусном, грибковом поражении аноректальной зоны.

Нельзя применять препарат во время беременности и в период кормления грудью. Препарат противопоказан в грудном возрасте.

С осторожностью следует применять препарат у больных с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью.

#### **Особые указания**

Препарат не следует применять после истечения срока годности и следует хранить в недоступном для детей месте.

#### **Форма выпуска**

Мазь для местного применения.

По 10 г мази в алюминиевой тубе. По 1 тубе вместе с инструкцией по применению и пластиковой насадкой (канюля-дозатор) в картонной пачке.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше +25°C.

#### **Срок годности**

2 года.

#### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта врача.

#### **Производитель**

Санofi Индия Лимитед, Индия

54/A, Sir Mathuradas VasANJI Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai-400093, India