



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРОКТОСЕДИЛ PROCTOSEDYL

Торговое название препарата: Проктоседил® (Proctosedyl).

Лекарственная форма: мазь для местного применения

Состав:

1 грамм мази содержит:

активные вещества:

гидрокортизона ацетат	5,58 мг;
фрамицетина сульфат	10,00 мг;
гепарин натрия	100 МЕ;
эскулозид	10,00 мг;
бензокаин (этиламинобензоат)	10,00 мг;
бутамбен (бутиламинобензоат)	10,00 мг;

вспомогательные вещества: холестерин, парафин жидкий (Е905с), парафин мягкий белый (Е905с), полисорбат 80 (Е433), пропиленгликоль (Е1520), макрогол (полиэтиленгликоль) 400 (Е1521), макрогол (полиэтиленгликоль) 4000 (Е1521), макрогола (полиэтиленгликоль) 1500 (Е1521).

Описание: почти белая (с зеленовато-желтоватым оттенком) однородная гомогенная нежирная масса.

Фармакотерапевтическая группа: средство, применяемое в колопроктологии; (противогеморроидальное средство)

Код АТХ: С05АХ03

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат для лечения геморроя и других заболеваний аноректальной зоны.

Гидрокортизон - глюкокортикостероид, является противовоспалительным средством. Устраняет различные признаки и симптомы воспаления, такие как: краснота, отечность, боль и др.

Натриевая соль гепарина является антикоагулянтом. Предотвращает тромботические осложнения геморроя.

Фрамицетина сульфат - антибиотик широкого спектра действия для местного применения. Обладает бактерицидной активностью в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Эскулозид родственен витамину Р, уменьшает повышенную ломкость капилляров.

Этиламинобензоат и бутиламинобензоат обладают местным обезболивающим и противозудным действием, уменьшают спазм анального сфинктера.

Эффект препарата проявляется через несколько минут после применения.

Показания к применению

Внутренний и наружный геморрой; профилактика рецидивов; перианальная экзема, проктит, трещины заднего прохода; предоперационное и послеоперационное лечение больных с геморроем, послеродовой геморрой.

Способ применения и дозы

Небольшое количество мази наносится пальцем на участки локализации зуда или боли утром и вечером, а также после каждой дефекации.

Для более глубокого введения в прямую кишку надеть аппликатор на тюбик с мазью, убедиться в том, что он введен достаточно глубоко в прямую кишку, и затем, осторожно нажимая на тюбик с нижнего конца, постепенно вынуть аппликатор.

Мазь можно применять отдельно или в сочетании с ректальными капсулами. Проктоседил® применяется в течение короткого времени (не более 7 дней).

Побочные действия

Возможно появление чувства дискомфорта в области прямой кишки, других реакций повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Возможно появление жжения, сухости слизистой оболочки, присоединение вторичной инфекции.

При применении Проктоседила® в высоких дозах и/или в течение длительного времени повышается риск возникновения системных побочных эффектов, связанных с гидрокортизоном.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Препарат нельзя применять при туберкулезном, вирусном, грибковом поражении аноректальной зоны.

Нельзя применять препарат во время беременности и в период кормления грудью. Препарат противопоказан в грудном возрасте.

С осторожностью следует применять препарат у больных с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью.

Особые указания

Препарат не следует применять после истечения срока годности и следует хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска

Мазь для местного применения.

По 10 г мази в алюминиевой тубе. По 1 тубе вместе с инструкцией по медицинскому применению и пластиковой насадкой (канюля-дозатор) в картонной пачке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Срок годности

2 года.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Производитель

Санofi Индия Лимитед, Индия

Sanofi House, CTS No- 117 –B,L&T Business Park, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai- 400072

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственного средства на территории Республики Узбекистан:

Представительство «Санofi-Авентис Групп» в Республике Узбекистан

Ул. Ойбека, 24, г. Ташкент, 100015, Узбекистан

Тел: (998 71) 281 46 28/29

Факс: (998 71) 281 44 81

www.sanofi.uz