



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
ПРОКТОСЕДИЛ® М  
PROCTOSEDYL M**

**Торговое название препарата:** Проктоседил® М

**Лекарственная форма:** капсулы ректальные.

**Состав:**

В одной капсуле содержится:

*Активные вещества:*

фрамицетинасульфат*	5,00 мг
гидрокортизонаацетат	2,79 мг
эскулозид	5,00 мг
бензокаин (этиламинобензоат)	5,00 мг
бутамбен (бутиламинобензоат)	5,00 мг

\* - активность 670 мкг/мг

*Вспомогательные вещества:* ланолин, парафин мягкий белый, парафин жидкий\*\*

\*\* - количество жидкого парафина варьирует, основываясь на количестве фрамицетина сульфата.

*Состав оболочки капсулы:* желатин, глицерол (глицерин), метилпарагидроксибензоат (метилпарабен), пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен), титана диоксид (E171), вода очищенная.

**Описание:**

Мягкие желатиновые капсулы грушевидной формы светло-желтого цвета, содержащие желтовато-белую жирную массу.

**Фармакотерапевтическая группа:** средство для лечения геморроя.

**Код АТХ:** C05AX03.

**Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат для лечения геморроя.

Гидрокортизон - глюкокортикостероид, является противовоспалительным средством.

Устраняет различные признаки и симптомы воспаления, такие как: краснота, отечность, боль.

Фрамицетина сульфат - антибиотик широкого спектра действия для местного применения.

Обладает бактерицидной активностью в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Эскулозид - вещество сходное по своей химической структуре с витамином Р, уменьшает повышенную ломкость капилляров.

Этиламинобензоат и бутиламинобензоат обладают местным обезболивающим и противосудным действием, уменьшают спазм анального сфинктера.

Эффект препарата проявляется через несколько минут после применения.

**Показания к применению**

Внутренний геморрой.

**Способ применения и дозы**

Проктоседил М назначают утром и вечером, а также после каждой дефекации. Ректальную капсулу следует ввести как можно глубже в прямую кишку. После улучшения состояния количество ректальных капсул можно сократить до одной в день.

Проктоседил М ректальные капсулы можно комбинировать с мазью Проктоседил. Препарат применяется в течение короткого времени (не более 7 дней).

#### **Побочные эффекты**

- Чувство дискомфорта в области прямой кишки.
- Жжение в прямой кишке, сухость слизистой оболочки прямой кишки.
- Присоединение вторичной инфекции.
- Аллергические реакции.
- Риск возникновения системных побочных эффектов, связанных с гидрокортизоном (при применении ректальных капсул Проктоседил М в высоких дозах и/или в течение длительного времени).

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Туберкулезное, вирусное, грибковое поражения аноректальной зоны.

Беременность и период кормления грудью.

Грудной возраст.

*С осторожностью* следует применять препарат у больных с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью.

#### **Особые указания**

Препарат не следует применять после истечения срока годности и следует хранить в недоступном для детей месте.

#### **Форма выпуска**

Капсулы ректальные.

20 капсул во флаконах темного стекла, с завинчивающейся крышкой.

По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре от 8°C до 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

2 года.

По истечении срока годности препарат применять нельзя.

#### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

#### **Произведено:**

Sanofi India Limited, India/Санофи Индия Лимитед, Индия