



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРОКТОСЕДИЛ® М PROCTOSEDYL M

Торговое название препарата: Проктоседил® М

Лекарственная форма: капсулы ректальные.

Состав:

Одна капсула содержит:

активные вещества:

фрамицетинасульфат*	5,00 мг;
гидрокортизонаацетат	2,79 мг;
эскулозид	5,00 мг;
бензокаин (этиламинобензоат)	5,00 мг;
бутамбен (бутиламинобензоат)	5,00 мг;

* - активность 670 мкг/мг

вспомогательные вещества: ланолин, парафин мягкий белый, парафин жидкий**

** - количество жидкого парафина варьирует, основываясь на количестве фрамицетина сульфата.

Состав оболочки капсулы: желатин, глицерол (глицерин), метилпарагидроксibenзоат (метилпарабен), пропилпарагидроксibenзоат (пропилпарабен), титана диоксид (E171), вода очищенная.

Описание: мягкие желатиновые капсулы грушевидной формы светло-желтого цвета, содержащие желтовато-белую жирную массу.

Фармакотерапевтическая группа: средство, применяемое колопроктологии (для лечения геморроя).

Код АТХ: C05AX03.

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат для лечения геморроя.

Гидрокортизон - глюкокортикостероид, является противовоспалительным средством. Устраняет различные признаки и симптомы воспаления, такие как: краснота, отечность, боль. Фрамицетина сульфат - антибиотик широкого спектра действия для местного применения. Обладает бактерицидной активностью в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Эскулозид - вещество сходное по своей химической структуре с витамином Р, уменьшает повышенную ломкость капилляров.

Этиламинобензоат и бутиламинобензоат обладают местным обезболивающим и противозудным действием, уменьшают спазм анального сфинктера.

Эффект препарата проявляется через несколько минут после применения.

Показания к применению

Внутренний геморрой.

Способ применения и дозы

Проктоседил М назначают утром и вечером, а также после каждой дефекации. Ректальную капсулу следует ввести как можно глубже в прямую кишку. После улучшения состояния количество ректальных капсул можно сократить до одной в день.

Проктоседил М ректальные капсулы можно комбинировать с мазью Проктоседил. Препарат применяется в течение короткого времени (не более 7 дней).

Побочные действия

- Чувство дискомфорта в области прямой кишки.
- Жжение в прямой кишке, сухость слизистой оболочки прямой кишки.
- Присоединение вторичной инфекции.
- Аллергические реакции.
- Риск возникновения системных побочных эффектов, связанных с гидрокортизоном (при применении ректальных капсул Проктоседил М в высоких дозах и/или в течение длительного времени).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Туберкулезное, вирусное, грибковое поражения аноректальной зоны.

Беременность и период кормления грудью.

Грудной возраст.

С осторожностью следует применять препарат у больных с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью.

Особые указания

Препарат не следует применять после истечения срока годности и следует хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска

Капсулы ректальные.

20 капсул во флаконах темного стекла, с завинчивающейся крышкой.

По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной пачке.

Условия хранения

Хранить при температуре от 8°C до 25°C.

Срок годности

2 года.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Санofi Индия Лимитед, Индия

Sanofi House, CTS No- 117 –B,L&T Business Park,Saki Vihar Road,Powai, Mumbai- 400072

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственного средства на территории Республики Узбекистан:

Представительство «Санofi-Авентис Групп» в Республике Узбекистан

Ул. Ойбека, 24, г. Ташкент, 100015, Узбекистан

Тел.: (998 71) 281 46 28/29

Факс: (998 71) 281 44 81

www.sanofi.uz